



paracox<sup>®</sup> 5

perfecto

El engranaje

## Paracox 5

la solución a la  
coccidiosis y el  
eje del  
programa

I.D.E.A.



**MSD**

Animal Health

**PARACOX-5:** Suspensión oral. Administración mediante pulverización, vía pinosa o vía agua de bebida. **COMPOSICIÓN POR DOSIS (0,004 ml):** *Emeru acervolina* HP 500 – 450 equinos\*, *E. maxima* CP 200 – 200 equinos, *E. maxima* MP 100 – 100 equinos, *E. mitis* HP 1000 – 1000 equinos, *E. tenella* HP 500 – 500 equinos. Para la administración mediante pulverización en la sala de incubación, el colorante alimentario rojo cochinitilla E120 recomendado debería ser añadido a la vacuna diluida para dar una concentración en la vacuna diluida de 0,1% o/e equivalente a 210 000 ug/av. La pinosa del rojo cochinitilla E120 debe cumplir con la Directiva de la Comisión 95/45/CE. \*De acuerdo con el procedimiento de recuento in vitro del fabricante en el momento del mezclado y a la liberación. **INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO:** Pollos: Para la inmunización activa de pollos de engorde para reducir la infección y signos clínicos de coccidiosis causados por *Eimeria acervolina*, *E. maxima*, *E. mitis* y *E. tenella*. La inmunidad comienza a desarrollarse dentro de los 14 días siguientes a la vacunación y se mantiene durante al menos 40 días tras la vacunación. **POSIDLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Una dosis única de Paracox 5 debe administrarse a pollitos al día de edad vía pinosa/sala de incubación (mediante pulverización) o a los 3 días de edad vía agua de bebida. Información detallada sobre Modo de administración en prospecto. **CONTRAINDICACIONES:** Ninguna. **PRECAUCIONES:** Paracox 5 es solo para administración oral mediante dilución y pulverización sobre las aves en la sala de incubación junto con el agente alimentario rojo añadido, o mediante pulverización sobre el pinosa y adición al agua de bebida. Vacunar solamente aves sanas. No administrar a pollos estresados. No ha quedado demostrado la seguridad del medicamento veterinario durante la puesta. No administrar agentes anticoccidiales u otros sulfonamidas o agentes multicomponentes antes o después de la vacunación con Paracox 5. No mezclar con ningún otro medicamento veterinario. Para más información sobre Advertencias y Precauciones, ver prospecto. No se ha determinado el período de validez después de abrir el envase primario. Por tanto, se recomienda que la vacuna sea diluida para usar inmediatamente tras haber abierto el vial. Conservar y transportar refrigerado (entre 2°C y 8°C). No congelar. Prevenir de la luz. **TIEMPO DE ESPERA:** Cero días. Sin embargo — medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. **Formatos:** Caja con 5 viales de 4 ml (1000 dosis). Caja con 5 viales de 20 ml (5000 dosis). Reg. N.º 1313 ESP SCHERING-PLOUGH, S.A. Carretera Nacional 1 Km 26, 28704 San Agustín de Guadalix (Madrid).