

VAXXITEK®

HVT+IBD

2000 DOSIS

Rentabiliza tu tiempo

NUEVA PRESENTACIÓN

**Doble
registro
Broilers y
Ponedoras**

- ÚNICA VACUNA COMBO HVT+IBD
- NO CONTIENE VIRUS DE GUMBORO VIVO EN SU ESTRUCTURA
- NO LESIONA LA BOLSA DE FABRICO
- PROTEGE FRENTE A TODAS LAS CEPAS DEL VIRUS IBD
- OFRECE UNA PROTECCIÓN DE LARGA DURACIÓN

Vaxxitek HVT+IBD Cada dosis de vacuna contiene: • Virus vivo vHVT013-69, como mínimo... 3,6 log₁₀ UPF • Expiante..... c.s.p. 1 dosis • Disolvente... c. s.p. 1 dosis. **INDICACIONES:** inmunización activa de las pollos. • Para prevenir la mortalidad y reducir los signos clínicos y las lesiones debidas a la bursitis infecciosa aviar. La protección comienza a partir de 14 días después de la vacunación y perdura al menos hasta la 7ª semana de edad. • Para reducir la mortalidad, los signos clínicos y las lesiones debidas a la enfermedad de Marek. La protección está presente a partir de 4 días después de la vacunación. Una única vacunación permite proteger a los animales durante el periodo de riesgo. **CONTRAINDICACIONES:** Vacunar solamente aves en buen estado de salud. No utilizar empalmes durante el puesto o la reproducción. **REACCIONES ADVERSAS:** Ninguna conocida. Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario. **ESPECIES AVIALES QUE VA DESTINADO:** Pollos de 1 día de edad y huevos embrionados de 18 días de edad. **DOSIFICACIÓN PARA CADA ESPECIE, VÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:** La vacuna puede ser administrada por vía subcutánea o por vía in ovo. Para la administración in ovo, puede utilizarse una máquina de inyección de huevos automatizada. El dispositivo debe despejar sus libera de forma segura y precisa la dosis de vacuna apropiada. Deben seguirse estrictamente las instrucciones para la utilización de este aparato. **Vía subcutánea:** una única inyección de 0,2 ml por parte a especie de 1 día. **Vía in ovo:** una única inyección de 0,85 ml por huevo sembrado a los 18 días de edad. **RECOMENDACIÓN PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:** Llevar guantes y gafas protectoras durante las operaciones de descongelación y apertura de las ampollas. Sacar del contenedor de nitrógeno líquido solamente aquellas ampollas que se vayan a utilizar inmediatamente. Descongelar rápidamente el contenido de las ampollas por agitación en agua a 25-30 °C. Pasar rápidamente a la etapa siguiente. Tan pronto como estén descongeladas, abrir las ampollas manteniéndolas a la distancia de la longitud del brazo o el momento de la apertura, a fin de prevenir cualquier presión o herida en caso de que se rompa una ampolla de forma brusca. Una vez abierta la ampolla de vacuna, aspirar su contenido con una jeringa estéril de 5 ml. Trasladar la suspensión al disolvente (No utilizar el producto si presentan un aspecto turbio). Aspirar 2 ml del contenido del disolvente con la jeringa. Enjuagar la ampolla con estos 2 ml y trasladar entonces el líquido de enjuague al disolvente. Repetir la operación 1 o 2 veces. Retirar las perforaciones de descongelación, apertura, traslado y enjuague para el número apropiado de ampollas que serán reconstruidas en el disolvente o bien 1 ampolla para 200 ml de disolvente para administración subcutánea o 4 ampollas para 200 ml de disolvente para administración in ovo. La vacuna disuelta preparada como se ha descrito, se homogeneiza por agitación suave de esta manera, hasta esta punto sólo. Entonces, debe ser utilizada inmediatamente (la totalidad de la vacuna disuelta debe ser utilizada en menos de una hora). Por esto, la suspensión de vacuna debe prepararse a medida que se vaya a utilizar. **TIEMPO DE ESPERA:** Cero días. **PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:** Manténgase fuera del alcance de los niños. Obsérvese y transportar congelado en nitrógeno líquido (-196°C). No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en la ampolla. Registro n.º EU/2/02/032/001.

Merial es una empresa líder en innovación que provee una amplia gama de productos para mejorar la salud, el bienestar y el rendimiento de los animales. Merial cuenta con unos 5000 empleados y está presente en más de 150 países en todo el mundo. Sus ventas durante el año 2006 superaron los 1900 millones de USD. Merial es fruto de la fusión entre Mérieux & Co. y sanofi-aventis. Para más información, consulte nuestras webs www.merial.com y <http://es.merial.com> Merial LABORATORIOS, S.A. U. Tarragona, 161, Local 68 DIE CORTA BARCELONA
Tel: (+34) 93 2928388 Fax: (+34) 932928389 www.merial.com



Merial es un miembro de