

# Rhemox 500

500 mg/g Polvo oral  
para administrar en agua de bebida

Garantía de solubilidad  
y estabilidad



Calidad hasta la última gota



**Rhemox 500** Polvo oral para administrar en agua de bebida. Únicamente para uso veterinario. **Composición cualitativa y cuantitativa:** Amoxicilina trihidrato, 500 mg (equivalente a 435,6 mg de amoxicilina base); Excipiente c.s.p. 1 g. **Especies de destino e indicaciones:** Porcino: tratamiento de procesos infecciosos causados por *Streptococcus suis*. Pollos, pavos y palos de engorde: tratamiento de pasteurellosis y colibacilosis, causados por cepas sensibles a la amoxicilina. **Contraindicaciones:** No administrar a animales con antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas. No administrar por vía oral a conejos, cobayas y hamsters ya que la amoxicilina, al igual que todas las aminopenicilinas, tiene una acción importante sobre la población bacteriana cecal. No administrar a équidos ya que la amoxicilina, al igual que todas las aminopenicilinas, tiene una acción importante sobre la población bacteriana cecal. Por vía oral, no administrar a animales con el rumen funcional. **Precauciones:** Las penicilinas y las cefalosporinas producen reacciones de hipersensibilidad tras la inyección, inhalación, ingestión o contacto con la piel. Se observan reacciones de hipersensibilidad cruzada entre cefalosporinas y penicilinas. No manipule el producto si es alérgico a las penicilinas y/o cefalosporinas. Manipular el producto con cuidado para evitar inhalar el polvo así como el contacto con piel y ojos durante su incorporación al agua tomando precauciones específicas. Si aparecen síntomas tras la exposición, como una erupción cutánea, consultar a un médico y pesquisar las advertencias. La inflamación de la cara, labios u ojos o dificultad respiratoria son signos más graves que requieren atención médica urgente. **Tiempo de espera:** Carne: Porcino: 6 días. Pollos: 1 día. Pavos: 5 días. Patos: 7 días. No está permitido su uso en aves ponedoras cuyos huevos se destinen al consumo humano. No usar en las 4 semanas anteriores al comienzo del periodo de puesta ni durante la puesta. **Conservación:** Conservar en lugar seco y protegido de la luz; conservar a temperatura inferior a 25 °C. **Presentación:** Envases 400 g. y 1Kg. Reg. nº: 1579 ESP. *Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.*

**Industrial Veterinaria, S.A.**  
Productos de Sanidad Animal

Esmaragda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) España  
Tel: +34 93 470 62 70 / Fax: +34 93 372 75 56  
Email: [invesa@invesagroup.com](mailto:invesa@invesagroup.com)  
[www.invesagroup.com](http://www.invesagroup.com)



**invesa**