

Gallivac® SE

Gallimune® Se+St

SDK
SALMONELLA DIAGNOSTIC KIT

Protección GLOBAL 360°

PARA EL CONTROL DE LA SALMONELA

Vacuna **VIVA**
Vacuna **INACTIVADA**
Kit de diferenciación: **TRAZABILIDAD**

GALLIMUNE SE+ST. Cada dosis de 0,3 ml de vacuna contiene: *Salmonella* Enteritidis PT4 inactivada, como mínimo 42 U.P.; *Salmonella* Typhimurium DT 104 inactivada, como mínimo 149 U.SAT. **Adyuvante:** Aceite de parafina (1 mg 0,3 ml). **Indicaciones:** Inmunización activa de pollitas, futuras ponedoras. Indicada para reducir la diseminación de *Salmonella* Enteritidis en el ovario y de *Salmonella* Typhimurium y Enteritidis en el tracto intestinal. **Posología y forma de administración:** Inyectar por vía intramuscular una dosis (0,3 ml) de vacuna, de acuerdo con la siguiente pauta de vacunación: Primera inyección: a partir de las 5 semanas de edad. Segunda inyección: a las 16 semanas de edad. El intervalo entre las dos inyecciones tiene que ser de 4 semanas como mínimo. **Contraindicaciones:** No debe utilizarse dentro de las 2 semanas antes de iniciarse la puesta ni durante el período de puesta. **Tiempo de espera:** Cero días. **Precauciones especiales de conservación:** Conservar y transportar refrigerado entre 2°C y 8°C, protegido de la luz. No congelar. **Presentaciones comerciales:** Frasco de 300 ml (1.000 dosis) Registro N° 1764 ESP De Uso Veterinario - Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. **IDT SALMONELLA DIAGNOSTIC KIT.** IDT *Salmonella* Diagnostic Kit tiene 2 medios especiales para la diferenciación entre cepas vacunales y de campo: *Salmonella* Dublin, *Salmonella* Typhimurium y *Salmonella* Enteritidis. **Indicaciones:** Está indicado en casos donde sea necesario distinguir entre cepas de campo y vacunales de los serotipos Dublin, Typhimurium y Enteritidis, por razones epidemiológicas. **CEPA DE CAMPO: Medio A:** Crecimiento. **Medio B:** Crecimiento. **CEPA VACUNAL: Medio A:** NO Crecimiento. **Medio B:** Crecimiento. **Presentación:** Envase con 5 x 5 ml Medio A y 5 x 5 ml Medio B azules epidemiológicos. Registro N° 1286 RD. Exclusivamente para uso de laboratorio. **GALLIVAC® SE.** **Composición:** Una dosis de vacuna contiene de 1 a 8 x 10⁸ U.P.C. de *Salmonella* Enteritidis mutante, cepa 441/014, doblemente atenuada (axrodiférica adenina/histidina). **Indicaciones:** Inmunización activa de las pollitas para reducir la colonización, persistencia e invasión del tracto intestinal y de los órganos internos por *Salmonella* Enteritidis y *Salmonella* Typhimurium. **Posología y forma de administración:** Inmunización contra *Salmonella* Enteritidis y *Salmonella* Typhimurium. Una dosis a partir de 1 día de edad, una segunda dosis seis semanas después y una tercera dosis alrededor de las 13 semanas de edad. **Contraindicaciones:** No vacunar a las pollitas que no estén sanas o que se encuentren bajo fuertes condiciones de estrés. No rejar en pollos de engorde. **Tiempo de espera:** Carne: 6 semanas desde la última vacunación. Huevos: 6 semanas después de las dos primeras vacunaciones ó 3 semanas después de la tercera vacunación. **Precauciones especiales de conservación:** Conservar entre 2°C y 8°C y protegido de la luz. Después de su reconstitución, usar en 4 horas. **Presentaciones comerciales:** Caja de 10 frascos de 1.000 dosis y caja de 1 frasco de 5.000 dosis. Registro N° 1855 ESP De Uso Veterinario - Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. MERIAL LABORATORIOS S.A., c/ Tarragona 151, locales 0/1E, 08014 Barcelona

