



# EFICACIA DEMOSTRADA

## FRENTE A GUMBORO/MAREK

Doble  
registro  
Broilers y  
Ponedoras

- ÚNICA VACUNA COMBO HVT+IBD
- NO CONTIENE VIRUS DE GUMBORO VIVO EN SU ESTRUCTURA
- NO LESIONA LA BOLSA DE FABRICO
- PROTEGE FRENTE A TODAS LAS CEPAS DEL VIRUS IBD
- OFRECE UNA PROTECCIÓN DE LARGA DURACION

Vaxxitek® HVT+IBD Cada dosis de vacuna contiene: •Virus vivo vHVT013-69, como mínimo....3,6 log10 UPF • Excipiente.....c.s.p. 1 dosis •Disolvente....c. s.p.1 dosis INDICACIONES. Inmunización activa de los pollitos: • Para prevenir la mortalidad y reducir los signos clínicos y las lesiones debidas a la bursitis infecciosa aviar. La protección comienza a partir de 14 días después de la vacunación, y persiste al menos hasta la 9ª semana de edad • Para reducir la mortalidad, los signos clínicos y las lesiones debidas a la enfermedad de Marek. La protección está presente a partir de 4 días después de la vacunación. Una única vacunación permite proteger a los animales durante el periodo de riesgo. CONTRAINDICACIONES Vacunar solamente aves en buen estado de salud. No utilizar en gallinas durante la puesta o la reproducción. REACCIONES ADVERSAS Ninguna conocida. Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario. ESPECIES A LAS QUE VA DESTINADO Pollitos de 1 día de edad y huevos embrionados de 18 días de edad DOSIFICACIÓN PARA CADA ESPECIE, VÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN La vacuna debe ser administrada por vía subcutánea o por vía in ovo. Para la administración in ovo, puede utilizarse una máquina de inyección de huevos automatizada. El dispositivo debe demostrar que libera de forma segura y efectiva la dosis de vacuna apropiada. Deben seguirse estrictamente las instrucciones para la utilización de este aparato. Vía subcutánea: una única inyección de 0,2 ml por pollito a la edad de 1 día Vía in ovo: una única inyección de 0,05 ml por huevo embrionado a los 18 días de edad. RECOMENDACIÓN PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Llevar guantes y gafas protectoras durante las operaciones de descongelado y apertura de las ampollas. Sacar del contenedor de nitrógeno líquido solamente aquellas ampollas que se vayan a utilizar inmediatamente. Descongelar rápidamente el contenido de las ampollas por agitación en agua a 25-30°C. Pasar rápidamente a la etapa siguiente. Tan pronto como estén descongeladas, abrir las ampollas manteniéndolas a la distancia de la longitud del brazo en el momento de su apertura, a fin de prevenir cualquier riesgo de herida en caso de que se rompiera una ampolla de forma brusca. Una vez abierta la ampolla de vacuna, aspirar su contenido con una jeringa estéril de 5 ml. Trasladar la suspensión al disolvente (No utilizar el producto si presenta un aspecto turbio). Aspirar 2 ml del contenido del disolvente con la jeringa. Enjuagar la ampolla con estos 2 ml y trasladar entonces el líquido de enjuague al disolvente. Repetir la operación 1 ó 2 veces. Repetir las operaciones de descongelación, apertura, traslado y enjuagado para el número apropiado de ampollas que serán reconstituídas en el disolvente o bien 1 ampolla para 200 ml de disolvente para administración subcutánea, o 4 ampollas para 200 ml de disolvente para administración in ovo. La vacuna disuelta preparada como se ha descrito, se homogeniza por agitación suave: de esta manera, está lista para su uso. Entonces, debe ser utilizada inmediatamente (la totalidad de la vacuna disuelta debe ser utilizada en menos de una hora). Por esto, la suspensión de vacuna debe prepararse solo a medida que se vaya utilizando. TIEMPO DE ESPERA Cero días PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN Manténgase fuera del alcance de los niños. Conservar y transportar congelado en nitrógeno líquido (-196° C) No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en la ampolla. Registro nº EU/2/02/032/001.

Merial es una empresa líder en innovación, que provee una amplia gama de productos para mejorar la salud, el bienestar y el rendimiento de los animales. Merial cuenta con unos 5000 empleados y está presente en más de 150 países en todo el mundo. Sus ventas durante el año 2005 superaron los 1900 millones de US\$. Merial es fruto de la fusión entre Merck & Co, y sanofi-aventis. Para más información, consulte nuestras webs [www.merial.com](http://www.merial.com) y <http://es.merial.com> Merial Laboratorios, S.A. c/ Tarragona, 161, Locales D/E 08014 BARCELONA Tel : (+34) 93 2928383 Fax : (+34) 932928389 [www.merial.com](http://www.merial.com)

