NUEVOS PRODUCTOS

Bayer lanza Virkon® S Tablets, el primer desinfectante en tabletas efervescentes de uso ganadero

Bayer amplía la gama de productos de higiene y bioseguridad con el lanzamiento de Virkon® S Tablets, el primer de desinfectante en tabletas efervescentes para uso veterinario, que está indicado para la desinfección de pequeñas superficies y equipos, como comederos, bebederos, pediluvios, jaulas, equipo de laboratorio, casetas, aviarios, salas hospitalarias, terrarios, etc.

Las tabletas mantienen toda la eficacia desinfectante de Virkon® S frente a virus, bacterias y hongos, pero en un formato más cómodo de almacenar, y más fácil y rápido de preparar: basta 1 tableta en 500 ml de agua para disponer de una solución al 1%. Esta cantidad es suficiente para matar bacterias y hongos en menos de 5 minutos de contacto, y virus tan resistentes como el parvovirus en 10 minutos o menos.

La solución desinfectante se aplica mediante pulverizador o mediante un paño o esponja impregnados con la solución. El producto es eficaz a bajas temperaturas, en superficies porosas, con aguas duras, y en presencia de materia orgánica. Además, tiene un buen perfil de seguridad para los animales y el medio ambiente.

Su eficacia está apoyada por numerosos estudios independientes frente a los principales agentes patógenos que afectan tanto a los animales de producción como a los animales de compañía.

Con el lanzamiento de Virkon® S Tablets, que se comercializa en envases con 50 tabletas de 5 g., Bayer amplía su portfolio en materia de bioseguridad, para poder ofrecer tanto a veterinarios como ganaderos una amplia gama de productos que les permitan mantener las instalaciones en óptimas condiciones higiénico-sanitarias.

Para más información:
Carlota Gómez / Isabel López
Comunicación Bayer HealthCare
Tel: 93 495 67 69
isabel.lopez@bayer.com / info@prensabayer.com
www.prensabayer.com
www.bayerhealthcare.es

QUIMUNSA lanza BOMBEX® para un control efectivo del ácaro rojo

El principal problema al que se enfrentan las explotaciones avícolas es el ácaro rojo -*Dermanyssus gallinae*-. **QUIMUNSA,** empresa líder de insecticidas para el control de plagas, presenta como novedad el insecticida BOMBEX®, diseñado específicamente para combatirlo.

Las consecuencias del ácaro rojo son: estrés, daños y malestar en las aves, impidiendo su reposo, drástica disminución de la producción, manchado y desclasificación de huevos y transmisión de virus y bacterias, incluso al personal laboral.

Hasta la fecha se han probado numerosos insecticidas de diferentes familias con resultados dispares y sin controlar el problema. Ahora **QUIMUNSA,** con el fin de dar una solución a esta grave problemática, pone a disposición de las granjas el nuevo insecticida-acaricida BOMBEX®, basado en Abamectina.

QUIMUNSA se introdujo hace pocos años en el mercado ganadero y avícola pero su reputación y profesionalidad está avalada por cinco décadas de trabajo, esfuerzo y grandes éxitos. Este año celebra su 50 Aniversario con la satisfacción de ser el fabricante líder de productos insecticidas y raticidas para el control de plagas en el mercado de Sanidad Ambiental.

El insecticida está formulado especialmente para control del ácaro rojo. Los resultados son visibles de forma muy satisfactoria, reduciendo la población de forma rápida, eficaz y duradera. Está basado en la Abamectina, una molécula producto de la fermentación natural de la bacteria del suelo *Streptomyces avermitilis*, con actividad insecticida y acaricida, tanto por contacto como por ingestión. Actúa inmovilizando los parásitos, que dejan de alimentarse y mueren. El período de máxima eficacia es a partir del 3º – 4º día.

BOMBEX® es una formulación microencapsulada de liberación lenta para aumentar su persistencia. Ensayos de campo, realizados por laboratorio homologado, han dado una reducción de la población de ácaros del 95% hasta 40 días.

QUIMUNSA recuerda que el modo de aplicación es fundamental en el buen resultado del tratamiento, debiendo tratarse escrupulosamente todas las superficies, grietas y escondrijos donde se aloja el parásito, al atardecer o de noche, período de su máxima actividad. La eliminación es prácticamente total entre el 4º y 7º día y la persistencia del tratamiento dependerá de la calidad de éste y de las condiciones ambientales - grado de limpieza, contaminaciones externas, etc.-

Más información:
Tel. 636457225 · 946741085
l.heredia@quimunsa.com