

EFICACIA DEMOSTRADA

FRENTE A GUMBORO/MAREK

Doble registro
Broilers y Ponedoras

- ÚNICA VACUNA COMBO HVT+IBD
- NO CONTIENE VIRUS DE GUMBORO VIVO EN SU ESTRUCTURA
- NO LESIONA LA BOLSA DE FABRICIO
- PROTEGE FRENTE A TODAS LAS CEPAS DEL VIRUS IBD
- OFRECE UNA PROTECCIÓN DE LARGA DURACIÓN

Vaxxitek® HVT+IBD Cada dosis de vacuna contiene: •Virus vivo vHVT013-69, como mínimo...3,6 log10 UPF • Excipiente....c.s.p. 1 dosis •Disolvente...c. s.p. 1 dosis •NDICACIONES. Immunización activa de los politios. • Para prevenir la mortalidad y reducir los signos clínicos y las lesiones debidas a la burstitis infecciosa aviar. La protección comienza a partir de 14 días después de la vacunación, y persiste al menos hasta la 9º semana de edad • Para reducir la mortalidad, los signos clínicos y las lesiones debidas a la entermedad de Marek. La protección está presente a partir de 14 días después de la vacunación. Una única vacuna permite proteger a los animales durante el periodo de riesgo. CONTRAINDICACIONES Vacunar solamente aves en buen estado de salud. No utilizar en gallinas durante la puesta o la reproducción. REACCIONES ADVERSAS Ninguna conocida. Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario. ESPECIES A LAS QUE VA DESTINADO Politios de 1 día de edad y huevos embrionados de 18 días de edad DOSIFICACIÓN PARA CADA ESPECIE, VÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN La vacuna debe ser administración in ovo, puede utilizarse una máquina de invección de huevos automatizada. El dispositivo debe demostrar que libera de forma segura y efectiva la dosis de vacuna apropiada. Deben seguirse estrictamente las instrucciones para la utilización de esta aparato. Vía subcutánea: una única inyección de 0,2 ml por político a la edad de 1 día Vía in ovo: una única inyección de 0,05 ml por huevo embrionado a los 18 días de edad. RECOMENDACIÓN PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Llevar guantes y gafas protectoras durante las operaciones de descongelado y apertura de las ampollas que se vayan a utilizar inmediatamente. Descongelar rápidamente el contenido de las ampollas por agitación en agua a 25-30°C. Pasar rápidamente el contenido de las ampollas por agitación en agua a 25-30°C. Pasar rápidamente el contenido de las ampollas por agitación en agua a 25-30°C. Pasar rápid

Merial es una empresa líder en innovación, que provea una amplia gama de productos para mejorar la salud, el bienestar y el rendimiento de los animales. Merial cuenta con unos 5000 empleados y está presente en más de 150 países en todo el mundo. Sus ventas durante el año 2005 superaron los 1900 millones de US\$. Merial es fruto de la fusión entre Merck & Co, y sanofi-aventis. Para más información, consulte nuestras webs www.merial.com y http://es.merial.com MERIAL LABORATORIOS, S.A. c/ Tarragona, 161, Locales D/E 08014 BARCELONA Tel : (+34) 93 2928388 Fax : (+34) 932928389 www.merial.com