

# Colmyc

Solución oral Enrofloxacinio al **20%**

¡Más especies, menos dosis!

**ESTÁ INDICADO EN EL TRATAMIENTO DE:**

Colibacilosis  
Mycoplasmosis  
Pasteurellosis



Tiempo de espera  
en CARNE



Tiempo de espera  
en CARNE



Tiempo de espera  
en CARNE



s.p. veterinaria, s.a.

Ctra. Tàrraco-Vinyols Km. 4,7 • 43000 RIUDOMS (Tarragona) • Tel. +34 977 850 1707 • Fax. +34 977 850 405 • Ap. Correos, 60  
[www.spveterinaria.com](http://www.spveterinaria.com)

Vía de administración: Administración en agua de bebida. Pollos y pavo: 10 mg de enrofloxacinio/kg p.v./día, durante 3-5 días consecutivos (equivalente a 0,05 ml de medicamento /kg p.v./día). Tratamiento durante 5 días consecutivos en caso de infecciones reñales y en procesos crónicos. Si no se observa mejoría clínica a los 2-3 días, deberá reconsiderarse el tratamiento en base a test de sensibilidad. Conejos: 10 mg de enrofloxacinio/kg p.v./día durante 5 días (equivalente a 0,05 ml de medicamento /kg p.v./día) para añadir al agua de bebida según el consumo de la misma. El agua medicada debe prepararse cada 24 horas. Usar siempre de dosificación apropiada y totalmente calibrada. Especifico de 1 y 5,90mg. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Titular de la autorización de comercialización: S.P. VETERINARIA S.A. Número de autorización de comercialización: 302713D.