las Alternativas
SELECCIONES AVICOLAS
Número 7. Julio 2014

NUEVA EXPLOTACIÓN DE OCAS PONEDORAS EN SEGOVIA

José A. Merino
Servicio Técnico de Avicultura de NANTA S.A.

En la localidad de Valdesimonte –Segovia-, junto al Parque Natural "Hoces del Duratón", se ha implantado una granja de 4.000 ocas para puesta en una finca propiedad del vivero "El Egidillo", uno de los mayores y mejor dotados de Castilla León, con superficie para pastos e instalaciones aprovechables para las mismas, que necesitan hacerlo como en su hábitat natural.

La máxima de la granja es hacer compatible la producción de huevos con el bienestar animal y el respeto al medio ambiente, para ofrecer a sus clientes un producto de máxima calidad.

No buscan tanto una gran producción como un producto diferenciado de otro tipo de huevo y con un esmerado mimo en la producción de los mismos. Para ello eligen la alimentación más conveniente y las mejores condiciones ambientales para sus animales en cada etapa.

Las instalaciones

Han aprovechado una parte de la finca para alojar bajo la cubierta, que antes utilizaban para proteger las plantas, a los animales durante la noche y parte del día y dotarlos, asimismo, de praderas que van rotando convenientemente para que pasten al aire libre durante el día, consumiendo una gran cantidad de hierba.

El suelo de los cobertizos es de tierra compactada y recubierta de paja para comodidad de los animales. En un lateral de la nave tienen los ponederos. Sencillos y muy bien pensados, con separaciones hechas con tablas de madera y con paja en el suelo para que las ocas se sientan confortables mientras ponen los huevos.

Estos ponederos facilitan la recogida de los huevos que, de otra forma, estarían repartidos por toda la nave,

lo que consumiría mucho tiempo y mano de obra. Algunas ocas ponen fuera de ellos, pero son las menos.

El pienso se distribuye en sencillos comederos para ovejas y es un sistema muy práctico que además evita que tiren alimento al suelo.

Estos comederos están provistos en la parte de arriba de rejillas para colocar la paja que, al igual que en las ovejas, sirve como aporte de fibra a libre disposición para las ocas.

El agua en bebederos automáticos repartidos por la nave y a una altura suficiente para que lleguen a beber con facilidad y no jueguen con ella y la tiren al suelo. Así tienen agua limpia y fresca en todo momento.

Características y hábitos raciales

La raza de ocas es la francesa Toulouse, de color blanco y grisáceo. Son muy longevas, pudiendo estar en producción durante 10 años.

Pesan unos 7 ó 8 kg de adultas en época de puesta y 2 kg menos en el descanso de la misma.

Esta raza de ocas es muy dócil, lo que facilita los movimientos entre la zona cubierta de puesta y los prados, o entre las distintas naves.

Soportan bien el frío, pero la lluvia y el viento les afecta muy negativamente; por ello si llueve o hace mucho viento las dejan en la nave.

La águilas, como especie de presa que son las ocas, les producen un alto nivel de estrés, agrupándose para intentar protegerse de las mismas. A su vez, necesitan ser protegidas de las alimañas. Para ambos casos están acompañadas de perros mastines, adiestrados a tal efecto, que también sirven para ayudar en los traslados.

Las ocas reproductoras -madres de las ponedoras- están en Francia, y su producción está enfocada a la obtención de ocas para embuchar y así obtener el tan apreciado foie gras.

El manejo

Para las ocas ponedoras, una vez “nacidas”, se seleccionan las hembras y se trasladan y recrían en la granja de destino, cuidando su alimentación y vigilando su crecimiento armónico para que inicien su ciclo de puesta una vez adquirida la edad y, sobre todo, el peso adecuados.

Hasta las 12 semanas se les suministra pienso *ad libitum* para recría y posteriormente de forma racionada hasta la **entrada en puesta a las 25-27 semanas de vida**. Además del pienso se suministra pasto abundante y fresco.

Durante la puesta llegan a comer gran cantidad de pienso y pasto, de aquel hasta 300 g en el pico de puesta; pero llega un momento, pasado éste, en que decae el consumo hasta llegar a unos 200 g o menos, llegando a perder bastante peso -hasta 2 kg- debido al desgaste que produce la puesta.

Para facilitar el manejo se han establecido lotes de unas 900 ocas. Así se disminuye además, en la medida de lo posible, la estacionalidad de la producción, a la vez que se racionalizan los pastos de las praderas y los alojamientos y mejora la sanidad de los animales.

Producción de huevos

La producción de huevos va destinada fundamentalmente a la restauración, aunque también se comercializan para determinados establecimientos especializados, tipo tiendas del gourmet.

La producción de huevos de oca es algo compleja, ya que esta especie tiene hábitos muy peculiares. Les afecta mucho la luz y las altas temperaturas.

Las ocas tienen dos ciclos de puesta en el año, primavera y otoño, de enero/febrero hasta junio, con parada durante el verano y reanudando la producción en setiembre/octubre hasta terminar en diciembre. En total ponen una media de 50 huevos /año y oca, repartiéndose esta cantidad casi en la mitad entre los dos ciclos: de 20 a 25 huevos en el primero y de 25 a 30 huevos en el segundo.

En el pico de puesta, en el momento de máxima producción, llegan a poner casi el 50 % de las ocas cada día -unos 3 huevos/semana y oca-. Después del pico de puesta bajan hasta 2 huevos/semana. En este momento, debe valorarse si es interesante seguir con la puesta o actuar con la alimentación para ayudar a inducir la parada de la producción de huevos.

Los huevos alcanzan una media de 180 gramos de media, desde 150 a 200 g. Su yema es proporcionalmente más grande que la clara, de color amarillo vivo, con textura densa y un sabor intenso derivado de la cría y producción extensiva. Los huevos de oca son ricos en hierro y con un contenido muy alto en vitaminas B y E, con sus propiedades antioxidantes.

Tabla 1. Características nutricionales de los huevos de oca.

Proteína, %	14,00
Grasas, %	13,70
Grasas saturadas, %	3,40
Carbohidratos, %	1,70
Azúcares, %	0,80
Sodio, mg/100 g	131

Este tipo de producción es compleja, como hemos dicho, pero su comercialización es el verdadero reto para salir adelante con éxito y debe ir acompañada de una venta muy profesional y dirigida a un segmento del mercado muy especializado en este tipo de productos.

Alimentación

La alimentación varía mucho de la época de producción a la de descanso. Como es lógico, las necesidades de nutrientes son mucho más altas en la época de puesta y la proporción de los mismos también.

Tabla 2. Características nutricionales de un pienso de puesta

Proteína bruta, %	17,00
Grasa bruta, %	4,50
Fibra bruta, %	3,90
Almidón, %	39,00
Calcio, %	3,00
Fósforo, %	0,60
Sodio, %	0,18

A modo de ejemplo, un pienso para la época de puesta puede estar compuesto fundamentalmente por maíz, cebada, trigo y soja, con alrededor del 20 % cada uno de estos ingredientes, además de un alto contenido en carbonato cálcico -alrededor de un 7 %-, un 1 % de fosfato y un 0,3 % de sal.

El pienso de mantenimiento contiene menos cantidad de soja, una parte de la cual puede sustituirse por girasol.

Lógicamente, las necesidades para el mantenimiento son menores, en proteína alrededor del 12 % y en calcio, un 1,5 %, aproximadamente. Sin embargo, las necesidades de fibra son mayores, casi el doble: 6,4 %

Además de estas diferencias en el pienso entre los distintos períodos, las ocas tienen a su disposición mucho más pasto natural en las épocas de reposo, ya que en invierno el pasto es muy escaso, por la temperatura, mientras que en verano, como se riegan las praderas, la producción de hierba es mayor.

Desde el sector de la nutrición avícola damos la bienvenida a esta explotación y le deseamos lo mejor, apoyando este tipo de proyectos pioneros que pueden ser una buena alternativa frente a la saturación de otros mercados. •

Debate sobre el nuevo Reglamento europeo de producción ecológica

El pasado 14 de julio se reunió el Consejo de la Unión Europea para iniciar el debate sobre la propuesta legislativa de la Comisión sobre el nuevo Reglamento europeo de producción ecológica que, de entrada, mereció las críticas de todos los Ministros asistentes al mismo.

La discusión se organizó teniendo en cuenta 3 bases principales:

- Las normas de producción, con eliminación de las excepciones previstas.
- Las normas de control, con armonización de los controles sobre las producciones ecológicas y los controles oficiales.
- El alineamiento con el tratado de Lisboa.

Una vez expuestos los objetivos de la propuesta y los del Plan de Acción, que se pretende que refuerce dichos fines, por parte del Ministro italiano que presidía la reunión, se inició la participación de los representantes de los distintos estados miembros.

Algunos Ministros hicieron hincapié en la especificidad de los controles en las distintas producciones ecológicas, así como en la necesidad de mantenerlos dentro del marco legal de este tipo de agricultura. También se trató de la necesidad de encontrar un equilibrio entre la armonización legislativa para satisfacer la confianza de los consumidores y el fomento de este tipo de agricultura para alentar a los productores a iniciar o seguir con este sistema.

En general, los Ministros reunidos coincidieron con la Comisión en los objetivos propuestos, pero no en la forma que de alcanzarlos tal como se muestra en la propuesta del nuevo Reglamento. Los Ministros de Agricultura de Alemania y de Austria fueron quienes plantearon un rechazo más enérgico a la propuesta, sugiriendo aquel utilizar el actual reglamento como base por ser la fórmula que puede tener más éxito para lograr los objetivos mencionados por la Comisión.

La mayor parte de los países coincidieron en que la implantación de esta propuesta generaría un declive de la agricultura ecológica europea, por imposibilidad de adaptarse a algunos requisitos, como los referentes a las explotaciones mixtas o la eliminación de determinadas excepciones, con el consiguiente cese de actividad de muchos productores. •

Francia: alojamientos colectivos para los patos del sector del foie gras

El 31 de diciembre del 2015: este es plazo, ya innegociable, para que todos los criadores franceses de patos para la producción de foie gras hayan cambiado sus tradicionales jaulas de cebo individual por las colectivas que ordena la legislación comunitaria.

El tema volvió a ser objeto de debate en las últimas Jornadas sobre palmípedas grasas, que se celebraron el mes de marzo pasado en Mont-de-Marsan, Francia, sobre las cuales ya informamos brevemente en el número de mayo pasado. En ellas, según el CIFOG -Comité Interproffesionel des palmipèdes à foie gras- se puso en evidencia que en el país vecino se estima que aun queda un 41 % de los productores que no han cambiado sus jaulas tradicionales por las colectivas que obliga la ley.

Quienes han realizado ya el cambio se han podido beneficiar de las ayudas que se han dado, por un importe de 10 millones de euros, a través de France Agrimer, lo que ha permitido la adaptación de las jaulas de unas 536.000 plazas de cebo. Pero el problema que se plantea a quienes no lo han hecho es que, en caso de llegarse a la fecha citada y seguir igual, la Comisión de la UE podrá abrir un contencioso con penalizaciones muy severas para los incumplidores, aparte de la más que probable campaña mediática de las asociaciones de protección animal.

Por parte de los criadores franceses ya cumplidores de la ley se indica que con la adopción de las jaulas colectivas para el cebo no solo han mejorado el bienestar de los patos sino también el de los mismos cuidadores. La explicación que dan se halla en quienes, un par de veces al día, se encargan manualmente del embuchado de los patos y que, en el caso de las jaulas individuales, acababan padeciendo dolores lumbares por la postura que han de adoptar...

Otros aspectos sometidos a discusión en las referidas Jornadas del CIFOG fueron las comparaciones entre los dos tipos de alojamiento en torno a los consumos de pienso, el trabajo, los volúmenes de efluentes, etc. •



adquiera éste y otros libros en

LIBRERIA AGROPECUARIA.com

www.LibreriaAgropecuaria.com