

Colmyc

Solución oral Enrofloxacino al **20%**

¡Más especies, menos dosis!

ESTÁ INDICADO EN EL TRATAMIENTO DE:

Colibacilosis
Mycoplasmosis
Pasteurellosis



s.p. veterinaria, s.a.

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 • 43008 RIUDOMS (Tarragona) • Tel. +34 977 850 170 • Fax. +34 977 850 405 • Ap. Correos, 60
www.spveterinaria.com

Vía de administración: Administración en agua de bebida. Pollos y pavo: 10 mg de enrofloxacin/kg p.a./día, durante 3 - 5 días consecutivos (equivalente a 0,05 ml de medicamento /kg p.a./día). Tratamiento durante 5 días consecutivos en caso de infecciones sistémicas y en procesos crónicos. Si no se observa mejoría clínica a las 2 - 3 días, deberá reevaluarse el tratamiento en base a test de sensibilidad. Conejos: 10 mg de enrofloxacin/kg p.a./día durante 5 días (equivalente a 0,05 ml de medicamento /kg p.a./día) para añadir al agua de bebida según el consumo de la bebida. El agua medicada debe prepararse cada 24 horas. Usar equipos de dosificación apropiados y debidamente calibrados. Envases de 1 y 5 litros. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Título de la autorización de comercialización: S.P. VETERINARIA S.A. Número de autorización de comercialización: 3023 ESP