selecciones avícolas

La revista avícola en español leída en más países

Nº 679

Julio 2015

Balance de las JPA 2015 en Soria

Los LED como fuente de luz monocromática

La composición del aire de la nave

Huevos españoles en el Congo

Nuestro más sincero agradecimiento a todos

¡Sin vosotros no sería posible!

JPA

JORNADAS PROFESIONALES DE AVICULTURA 2015

aseprhu · ProPollo · inprovo · federovo · AviAlter · asclea · Diputación de Soria · Ayuntamiento Soria · Universidad de Valladolid · Caja Rural de Soria · aje Soria Jóvenes Empresarios · Escuela de Agricultores · COBUR · Grupo AN · MERIAL

ABVista · AvicApp · Big Dutchman · DSM · EXAFAN · qanDaria · NOREL · nutega · SENA · s.p. veterinaria

Alltech · CALIER · CAVENO · Química + Instalaciones · uhigen · elektra · GESTIGANam · IBERTEC

INATEGA · Ingeniería avícola · Jefo · HIPRA · MERIAL · NANTA · NEW FARMS · núter · nutralSCA

Agrogi · andersen · Aviagen · andersen · bioplagen · cenavisa

cemosa · Cobb · CPC · COPILOT · COSMA · CTIcontrol · DUPONT

EVONIK · H&N · HUVEPHARMA · INDUKERN · ISA · itpsa · LUBING

MAYMO · PH Albio · Sokepa, s.l. · symaga · Tashia · TIGSA · Vencomatic

Su protección
Tú protección

Primun *Salmonella* E

PROTECCIÓN
80
SEMANAS DE VIDA

Vacuna viva de *Salmonella* Enteritidis para futuras ponedoras y reproductoras

Protección prolongada frente a *Salmonella* **Enteritidis**

- Duración de la inmunidad hasta 60 semanas después de la 3ª vacunación.
- Administración en el agua de bebida. Método fácil, económico y eficaz.
- Reduce eficazmente la colonización y la excreción fecal de cepas de campo de *Salmonella* Enteritidis.
- Protección desde el primer día de vida hasta el final del ciclo productivo.
- Bacteria atenuada, vacuna segura.
- Reducida supervivencia en el ambiente.

viales de 1.000 y 2.000 dosis

PRIMUN SALMONELLA E, liofilizado oral para pollos. **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS:** Cada dosis contiene: Bacteria viva atenuada de Salmonella entérica subsp enterica serovar Enteritidis, cepa CAL 10 Sm+/Rif+/Ssq-, mínimo 1 x 10^8 UFC y máximo 6 x 10^8 UFC. Inmunización activa para reducir la colonización y la excreción fecal de cepas de campo de Salmonella Enteritidis. Desarrollo de la inmunidad: A partir de los 14 días de la primera vacunación y a partir de las 4 semanas tras la 2ª y 3ª vacunación. Duración de la inmunidad: Hasta 60 semanas después de la tercera vacunación, cuando se utiliza según la pauta vacunal recomendada. **CONTRAINDICACIONES:** No usar en aves enfermas. No usar en aves durante la puesta y en las 3 semanas anteriores al comienzo del período de puesta. **ESPECIES DE DESTINO:** Pollos de reposición (futuras ponedoras y reproductoras). **POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** En el agua de bebida. Debe administrarse una dosis de vacuna por cada ave. La vacuna puede emplearse a partir del 1er día de vida. Programa de vacunación recomendado: Una dosis a partir de un día de edad, seguida de una segunda vacunación a la edad de 7 a 8 semanas y una tercera vacunación a las 18-20 semanas al menos 3 semanas antes de la puesta. **TIEMPO DE ESPERA:** Carne: 21 días. **PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:** Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). No congelar. Proteger de la luz. **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN y FABRICANTE:** LABORATORIOS CALIER S.A. c/ Barcelonès 26 P. I. El Ramassar, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS BARCELONA (ESPAÑA). REG: 3166 ESP.

CALIER
COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR ANIMAL

We add performance to your business

Coxiril® (diclazuril)

- Coccidiostato **químico** eficaz y seguro
- Permite el desarrollo de la **inmunidad** de forma **natural**
- Sus **microgránulos** facilitan una excelente homogeneidad en el pienso
- **0 días** periodo de retirada

Distribuidor:

INDUKERN

www.indukern.es

HUVEPHARMA®
We add performance to your business

www.huvepharma.com