

# Su protección Tu protección



## Primun Salmonella E

Vacuna viva de **Salmonella** Enteritidis para futuras ponedoras y reproductoras

Protección prolongada frente a **Salmonella** Enteritidis

- Duración de la inmunidad hasta 60 semanas después de la 3ª vacunación.
- Administración en el agua de bebida. Método fácil, económico y eficaz.
- Reduce eficazmente la colonización y la excreción fecal de cepas de campo de **Salmonella** Enteritidis.
- Inicio temprano de la inmunidad. Colonización efectiva de los órganos diana al tercer día postvacunación.
- Bacteria atenuada, vacuna segura.
- Reducida supervivencia en el ambiente.



viales de 1.000 y 2.000 dosis

PRIMUM SALMONELLA E, liofilizado oral para pollos. **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS:** Cada dosis contiene: Bacteria viva atenuada de Salmonella entérica subsp entérica serovar Enteritidis, cepa CAL 10 Sm+/Rif+/Ssq-, mínimo 1 x 10<sup>8</sup> UFC y máximo 6 x 10<sup>9</sup> UFC. Inmunización activa para reducir la colonización y la excreción fecal de cepas de campo de Salmonella Enteritidis. Desarrollo de la inmunidad: A partir de los 14 días de la primera vacunación y a partir de las 4 semanas tras la 2ª y 3ª vacunación. Duración de la inmunidad: Hasta 60 semanas después de la tercera vacunación, cuando se utiliza según la pauta vacunal recomendada. **CONTRAINDICACIONES:** No usar en aves enfermas. No usar en aves durante la puesta y en las 3 semanas anteriores al comienzo del periodo de puesta. **ESPECIES DE DESTINO:** Pollos de reposición (futuras ponedoras y reproductoras). **POSOLÓGIA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** En el agua de bebida. Debe administrarse una dosis de vacuna por cada ave. La vacuna puede emplearse a partir del 1er día de vida. Programa de vacunación recomendado: Una dosis a partir de un día de edad, seguida de una segunda vacunación a la edad de 7 a 8 semanas y una tercera vacunación a las 18-20 semanas al menos 3 semanas antes de la puesta. **TIEMPO DE ESPERA:** Carne: 21 días. **PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:** Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Proteger de la luz. **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y FABRICANTE:** LABORATORIOS CALIER S.A. c/ Barcelonès 26 P.I. El Ramassar, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS BARCELONA (ESPAÑA). REG: 3166 ESP.

**CALIER**  
COMPROMETIDOS CON  
EL BIENESTAR ANIMAL