LOS ANIMALISTAS QUEMAN TRES GALLINEROS EN FRANCIA

La escalada de violencia de los animalistas se ha cobrado una nueva víctima, al quemar tres gallineros en Francia. En esta ocasión se ha tratado de tres naves vacías, con un área total de 2. 200 m^2, pero distantes entre sí, que fueron incendiadas en la madrugada del pasado 17 de septiembre de 2019 en Normandel, a unos quince kilómetros al sur de L'Aigle, Orne, Francia.

No contentos con ello, los agresores dejaron pintadas con los textos "asesinos" y "campos de exterminio", grafiteados con pintura negra en las paredes de la granja. En pocos minutos, el criador propietario de los tres gallineros, Emmanuel Prévost perdió toda una vida de trabajo.

Estos incendios han sido duramente condenados por todos los sindicatos agrarios franceses y por el Ministro de Agricultura francés, Didier Guillaume, que ha visitado las tres naves avícolas incendiadas para dar todo su apoyo al avicultor y ver *in situ* los efectos de esta sinrazón.

Según dijo, hay premeditación ya que la policía encontró en el lugar sofisticados dispositivos incendiarios, declarando que ha sido un acto planificado y premeditado.

Por su parte, la presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores – FNSEA -, Christiane Lambert, ha declarado que "es un acto terrorista firmado por militantes antiespecistas y que se ha cruzado una línea, la línea de la violencia.

NOTICIAS

EL *CAMPYLOBACTER*, EN EL REINO UNIDO

Según un informe de la Food Standard Agency - FSA –, del Reino Unido, sobre la prevalencia de Campylobacter en los comercios de este país, en el período comprendido entre agosto de 2017 y julio de 2018 se ha encontrado que la elevada contaminación que anteriormente se había detectado ha disminuido considerablemente, pero sigue siendo alta en los minoristas más pequeños, los independientes y los carniceros.

En palabras de Rebecca Sudworth, Directora de la FSA, "los minoristas han logrado reducciones significativas en los niveles de contaminación por *Campylobacter* desde que comenzó la encuesta de pollos minoristas en 2014 pero nosotros continuaremos colaborando con la industria y particularmente con los comerciantes más pequeños para aprovechar este progreso".

El *Campylobacter spp.* se detectó en la mayoría de las muestras de piel del cuello de los pollo y el 7% de ellas tenían más de 1000 ufc/g, lo que es muy elevado. Hubo diferencias significativas en la proporción de pollos altamente contaminados - entre 0 y 21% - entre los diferentes tipos de minoristas, que no pudieron explicarse por las diferencias en la vida útil del producto, el peso del pollo, el período de muestreo o el tipo de crianza utilizado.

La comparación de los códigos de aprobación individuales – que identificaban los mataderos - también mostró una diferencia significativa en la proporción de pollos con más de 1000 ufc/g, oscilando entre 0 y 27%, observándose que algunos minoristas se abastecían principalmente de plantas específicas locales. No hubo diferencias significativas en la proporción de pollos altamente contaminados según el tamaño de las canales ni entre las aves criadas en condiciones estándar, al aire libre o en un sistema ecológico.

ALEMANIA DEBATE SI SUBIR EL IVA DE LA CARNE POR EL BIENESTAR ANIMAL Y EL MEDIOAMBIENTE

El pasado agosto Alemania se ha enfrascado en un enconado debate en torno a varias propuestas para elevar los impuestos a la carne y dedicar ese dinero a mejorar el bienestar animal o a la protección del medioambiente.

El tema saltó tras la opinión del portavoz parlamentario de Los Verdes para política agraria, Friedrich Ostendorff, en el diario "Welt", diciendo que estaba a favor de eliminar la reducción del impuesto sobre el IVA para la carne y destinarlo a medidas a favor del bienestar animal.

De aprobarse esta propuesta, ello significaría que el gravamen sobre los productos cárnicos pasaba del actual 7 % al 19 % y en el caso de las pechugas de pollo, ahora a 2,99 € en la cadena Aldi, se incrementaría hasta 3,32 €.

Mientras que las asociaciones para la conservación del medio ambiente y los colectivos vegetarianos y veganos han aplaudido, con mayor o menor cautela, las distintas ideas que, como sondas, han lanzado a la opinión pública los principales partidos, las reacciones no se ha hecho esperar en un país cuyos hitos gastronómicos pasan por la salchicha, el codillo y el "Schnitzel" - filete de ternera empanado -, y donde el ciudadano medio consume unos 60 kg de productos cárnicos al año.

Tras la propuesta inicial de Ostendorff, que han respaldado a título individual varios políticos de Los Verdes, el Partido Socialdemócrata – SPD - y la Unión Cristianodemócrata – CDU -, el Gobierno alemán se ha limitado a destacar las dificultades prácticas de la medida y apuntar que hay otras fórmulas más efectivas para mejorar el bienestar de los animales para la producción cárnica.

El grupo ecologista Greenpeace ha saludado la iniciativa por tratar de "poner fin a la reducción impositiva de los productos cárnicos y lácteos", estimando, que el cambio fiscal reduciría el consumo de carne en un 11% y elevaría los ingresos públicos en 3.600 millones. En cambio, Thomas Schröder, presidente de la Federación Alemana para la Protección Animal, ha propuesto directamente establecer un "impuesto a la carne" de unos "pocos céntimos el kilo", equiparándolo al impuesto a las emisiones de CO_2.

Sin embargo, las críticas han emergido desde todo el espectro político. El ultraderechista Alternativa para Alemania – AfD - ha denunciado que afectaría principalmente al "hombre de la calle", La Izquierda, en la misma línea, ha señalado que elevar el gravamen lastraría a los "socialmente discriminados" y los liberales del FDP temen que se dañe la competitividad del sector alemán frente al del resto de países europeos, un argumento que también han empleado los ganaderos.

EL CONSUMO DE HUEVOS Y LA DEMENCIA SENIL

Un estudio de la Universidad de Finlandia Oriental muestra que el consumo de huevos y de carne puede estar asociado con un menor riesgo de demencia senil.

El estudio se centró el los factores de riesgo de la cardiopatía isquémica y la aterosclerosis y se inició entre 1984 y 1989 sobre los hábitos dietéticos, el estilo de vida y la salud en general, de una muestra de 2.500 hombres finlandeses de 42 y 60 años, seleccionados al azar. Los datos se combinaron con sus registros hospitalarios, la causa de la muerte y los registros de reembolso de medicamentos después de un período de seguimiento de 22 años. Además, después de 4 años desde el inicio del estudio, otros 500 hombres completaron pruebas que analizar su memoria y sus procesos cognitivos.

El estudio ha encontrado que una mayor ingesta dietética de fosfatidilcolina de los participantes provenía principalmente de comer huevos y carne y es causa de un menor riesgo de desarrollar demencia al mejorar la función cognitiva. Como anteriormente otros estudios ya habían relacionado la ingesta de colina con el procesamiento cognitivo, ahora se piensa que ésta puede desempeñar un papel en la prevención del deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer.

Durante el seguimiento 337 hombres desarrollaron demencia, viéndose que el riesgo de ésta era un 28% menor en los que tenían la ingesta más alta de fosestidilcolina en comparación con aquellos con la ingesta más baja, sobresaliendo también en las pruebas que midieron su memoria y habilidades lingüísticas.

Estos hallazgos pueden desempeñar un papel en la prevención de la demencia senil, pero los investigadores indican que es necesario seguir estudiando sobre los trastornos de la memoria que conducen a la misma y a la enfermedad de Alzheimer, que es la causa más común de ella y para la cual no hay cura.

El hecho es que mientras que la colina, cuya ingesta es necesaria para la salud, debe ser consumida en la dieta, los alimentos ricos en ella son relativamente asequibles y fáciles de encontrar. Las fuentes principales de fosestidilcolina en las dietas de la población del estudio fueron los huevos – 39% - y la carne de diversa índole – 37% -. La colina es un nutriente esencial, siendo necesaria para la formación de acetilcolina, un neurotransmisor.